

NOUVEAUX COLÉOPTÈRES DE MADAGASCAR,

PAR M. M. PIC.

Les quelques nouveautés qui suivent proviennent de la riche collection de feu le major Sicard, léguée par testament au laboratoire d'Entomologie du Muséum de Paris.

Lophophyllus simplicicollis n. sp.

Elongatus, nitidus, fere glaber, castaneus, pro parte rufescens, thorace obscuriore, simplice, fere impunctato.

Allongé, brillant, offrant seulement quelques rares poils ou soies espacés, châtain ou roussâtre avec le prothorax plus foncé. Tête assez courte et peu large, plus étroite que le prothorax, plus claire en arrière, peu ponctuée; antennes longues et assez grêles, à articles 4 et suivants diversement, et plus ou moins, prolongés en dent à leurs extrémités, dernier article simple, assez long; prothorax noir, subglobuleux, presque lisse, à rebords antérieur et postérieur étroits; écusson petit; élytres bien plus larges que le prothorax, déprimés, longs, rétrécis à l'extrémité, sans stries appréciables mais à rangées de points carrés, avec les intervalles très étroits; pattes un peu robustes.

Longueur 7 millimètres. Tamatave.

Cette espèce se distingue, à première vue, des espèces connues par la forme et la sculpture de son prothorax.

On peut la placer près de *L. rugicollis* Fairm.

Cacoplesia apicicornis n. sp.

Angustata, subnitida, pro parte brevis holosericeo pubescens, nigro-viridescens, elytris paulo olivaceis, membris paulo brunneis, antennis ad basin femoribusque pro parte testaceis.

Étroit, peu brillant, en partie revêtu d'une pubescence soyeuse grise, noir à reflets verdâtres avec les élytres un peu olivâtres, membres en partie testacés, en partie rembrunis. Tête peu large, subalutacée, à ponctuation assez fine, en partie dense;

antennes grêles, filiformes, à dernier article particulier, un peu angulé de chaque côté avant l'extrémité puis très étroit sur la partie terminale, celle-ci tronquée au sommet; thorax court et peu large, faiblement rétréci en avant, un peu alutacé, à ponctuation fine et écartée; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, atténués postérieurement, finement strié-ponctués avec les intervalles déprimés, finement ponctués; pattes assez grêles, rembrunies avec la base des cuisses largement et partie des tibias testacés.

Longueur 10 millimètres. Région de Diégo-Suarez (Sicard).

Sans doute voisin de *C. caeruleovirens* Fairm, et paraissant en différer par la structure particulière du dernier article des antennes, les membres bicolores, etc.

MASTILIUS IMMACULATUS v. nov. **Sicardi.**

Parum elongatus, fere opacus, breve griseo pubescens, supra antice dense punctatus, elytris subnitidis et minus dense punctatis, niger, antennis ad basin, thorace circa, scutello, elytris, pectore pro parte pedibusque pro majore parte rufo-testaceis.

Longueur 4 millimètres. Provenance illisible, sans doute environs de Diégo-Suarez.

Diffère, à première vue, de *M. immaculatus* Pic par le prothorax bordé de roux et les élytres de coloration claire, à ponctuation moins rapprochée.

Mastilius 4-maculatus n. sp.

Elongatus, pro parte nitidus, breve griseo pubescens, niger, antennis ad basin pedibusque pro majore parte testaceis, elytris nigropiceis, antice et postice testaceo maculatis, pectore pro parte rufescente.

Allongé, revêtu d'une fine pubescence grise, noir avec la base des antennes, la majeure partie des pattes et macules antérieure et postérieure sur chaque élytre testacées. Tête et prothorax presque opaques, à ponctuation peu forte et dense, ce dernier presque carré, un peu rétréci en avant; antennes assez courtes et grêles, à derniers articles peu élargis; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, courtement rétrécis à l'extrémité, à ponctuation fine et assez dense; ces organes d'un noir de poix ont une macule subcarrée antérieure testacée qui recouvre toute la base et une postérieure allongée discale, cette dernière isolée à l'extrémité, du bord sutural et du bord latéral; pattes testacées, avec partie des cuisses foncée; dessous du corps foncé avec poitrine en partie rousse.

Longueur 3,5 mill. Mont d'Ambre, en novembre (Sicard).

Espèce voisine de *M. immaculatus* Pic et s'en distinguant par la forme plus allongée, en outre du dessin, très particulier, des élytres.

Xamerpus laterufus n. sp.

Oblongo-ovalus, subconvexus, nilidus, hirsulus, rufus, scutello, elytris, his ad humeros late rufis, maculatis et infra corpore nigris.

Oblong-ovalaire, peu convexe, hérissé de quelques soies, brillant, roux avec l'écusson, les élytres, moins une grande macule humérale, et le dessous du corps noirs. Tête grosse, à ponctuation fine et écartée; prothorax court et large, à peu près de la largeur des élytres, subarqué sur les côtés, à ponctuation pupilleuse peu marquée et écartée; élytres larges et assez courts, atténués à l'extrémité, à ponctuation forte et écartée, marginés sur les côtés, marge postérieurement en partie rousse, à ponctuation pas très forte et écartée.

Longueur 5 millimètres environ. Diégo-Suarez (Sicard).

Très voisin de *X. Perrieri* Frm., ayant, comme lui, une macule humérale claire, en différant, à première vue, par l'avant-corps roux, le prothorax moins convexe et la taille plus avantageuse.

Xamerpus nigriceps n. sp.

Oblongo-ovatus, subconvexus, nilidus, hirsulus, testaceus, capite antennisque apice nigris, infra corpore pro parte obscuro.

Oblong-ovalaire, peu convexe, hérissé de quelques poils dressés en dessus de la pubescence grise, testacé avec la tête et la moitié apicale des antennes noires, le dessous du corps en partie foncé. Tête assez grosse, à ponctuation peu forte et écartée; antennes longues; prothorax court et large, très arqué sur les côtés, un peu plus étroit que les élytres, à ponctuation assez forte et écartée; élytres larges et assez courts, atténués à l'extrémité, un peu comprimés sur les côtés antérieurs, largement marginés, à ponctuation forte, irrégulière, modérément écartée.

Longueur 4 millimètres. Mont d'Ambre (Sicard).

Espèce très distincte par sa coloration claire conjointement à sa forme robuste.

Xamerpus disconotatus n. sp.

Subovalus, convexus, nilidus, griseo pubescens, niger, elytris subcyanis, ad medium luteo maculatis, membris testaceis.

Subovalaire, convexe, brillant, orné d'une pubescence grise, noir avec les élytres bleutés et ornés d'une grande macule jaune médiane commune aux deux étuis, membres testacés. Tête assez

grosse; prothorax convexe, court et large, subarqué sur les côtés, de la largeur des élytres, à ponctuation pupilleuse peu forte et écartée; élytres courts et larges, atténués à l'extrémité, très bombés au milieu et comprimés sur les côtés, à rebord très large, à ponctuation inégale et diversement écartée.

Longueur 3 millimètres. Mont d'Ambre, de mars à mai (Sicard) ⁽¹⁾

Par sa forme se rapproche de *X. oxylepsiformis* Pic, mais ponctuation moins forte et coloration toute autre.

Xamerpus ruficollis n. sp.

Oblongo-elongatus, subconvexus, nitidus, griseo pubescens et hirsutus, niger, thorace rufo, antennis ad basin pedibusque testaceis.

Oblong allongé, un peu convexe, brillant, orné d'une pubescence grise avec quelques poils dressés, noir, prothorax roux, base des antennes et pattes testacées. Tête à ponctuation pas très forte et écartée; prothorax court et large, à peu près de la largeur des élytres, à ponctuation pupilleuse, médiocre et écartée; élytres assez larges et peu longs, atténués à l'extrémité, à ponctuation pas très forte, un peu écartée, à rebord assez large et un peu bordé de roux en avant.

Longueur 3 millimètres environ. Mont d'Ambre (Sicard).

Ressemble un peu à *X. minutus* Pic, en diffère par la tête, les élytres plus longs, plus finement ponctués, à dépression antérieure nulle.

(¹) Un exemplaire de cette espèce se trouve aussi dans la collection Pic.